

表 1. 研究対象者の個人臨床検査データ

対象者	年齢	性別	歯数	PPD	BOP	PISA	BL
H #1	26	F	27	2.1	28.0	45.43	0.9
H #2	31	F	28	2.3	4.0	59.57	3.1
H #3	30	F	24	2.1	13.0	115.0	1.3
H #4	27	M	30	2.7	20.0	52.82	1.3
H #5	31	F	28	2.3	12.0	161.1	3.3
H #6	28	F	32	2.0	16.0	190.0	1.1
H #7	29	F	28	2.5	19.0	35.58	0.2
H #8	26	M	28	2.0	38.0	113.53	1.1
H #9	30	F	28	2.2	6.0	93.4	0.3
H #10	27	F	30	2.4	23.0	81.76	1.5
AgP #1	24	F	31	3.4	38.0	735.2	14.4
AgP #2	19	F	28	3.6	46.0	1,107.7	26.3
AgP #3	26	M	27	3.0	27.0	621.4	24.8
AgP #4	27	M	31	3.8	44.0	994.6	30.7
AgP #5	24	F	28	4.3	77.0	2,351.9	33.0
AgP #6	24	F	28	4.0	74.0	1,818.1	32.1
AgP #7	27	M	28	4.6	88.0	2,338.2	21.3
AgP #8	34	F	30	3.2	46.0	1,187.4	12.9
AgP #9	31	M	26	4.4	87.8	2,396.3	17.1
AgP #10	32	M	28	3.7	43.0	1,108.6	19.7

PPD : 歯周ポケット深さ (mm), BOP : プロービング時出血 (%), PISA : 歯周炎症表面積 (mm²), BL : 歯槽骨吸収レベル (%), F : 女性, M : 男性

表 2. 研究対象者の臨床検査データのまとめ

	H (n = 10)	AgP (n = 10)	P 値*
年齢	28.5 ± 2.0	26.8 ± 4.5	n.s.
性別 (女性 / 男性)	8 / 2	5 / 5	NA
歯数	28.3 ± 2.1	28.5 ± 1.7	n.s.
PPD	2.26 ± 0.24	3.79 ± 0.53	< 0.0001
BOP	17.9 ± 10.2	57.1 ± 22.3	< 0.0001
PISA	103.3 ± 71.4	1,465.9 ± 22.3	< 0.0001
BL	17.9 ± 10.19	23.2 ± 7.3	< 0.0001

PPD : 歯周ポケット深さ (mm), BOP : プロービング時出血 (%), PISA : 歯周炎症表面積 (mm²), BL : 歯槽骨吸収レベル (%)

データは全て各群の平均値 ± 標準偏差

* Mann-Whitney *U* test ($p < 0.05$ で有意差あり)

n.s. : 有意差なし, NA : 適応なし